

انتعاش الطفل حديث الولادة باستخدام كمامة وكيس التنفس (Bag & Mask ventilation)

 اسم العيادة:
 اسم المشرف:
 التاريخ: / /
 اسم مزود الخدمة:

رقم 8	البنود التالية تمثل المعايير الموجودة في البرتوكولات أو الإرشادات الخاصة بالعناية بالطفل حديث الولادة باستخدام كمامة وكيس التنفس.	الملاحظات
1.	يستخدم مزود الخدمة كمامة ذات حجم مناسب.	لا ينطبق [لا] نعم []
2.	أوصل مزود الخدمة الكمامة ذات الحجم المناسب بالأكسجين بتركيز (90%-100%).	لا ينطبق [لا] نعم []
3.	مزود الخدمة يختبر الكمامة (ضغط جيد، صمام الضغط يعمل (شغال) ووصلة الصمام موجودة وتعمل (شغالة).	لا ينطبق [لا] نعم []
4.	مقياس الضغط يعمل إذا كان موجوداً.	لا ينطبق [لا] نعم []
5.	يكون مزود الخدمة عند رأس الطفل أو بجانبه ويضع الطفل في موضع التنشق.	لا ينطبق [لا] نعم []
6.	يضع مزود الخدمة الكمامة بشكل مناسب على الطفل.	لا ينطبق [لا] نعم []
7.	يفحص مزود الخدمة إحكام الكمامة على وجه الطفل، ثم يقوم بإعطاء نفسين أو ثلاث بضغط مناسب ويراقب حركة صدر الطفل. إذا ارتفع الصدر، يقوم بإجراء التنفس للطفل بمعدل 40-60 مرة في الدقيقة، مع المحافظة على ارتفاع وانخفاض صدر الطفل.	لا ينطبق [لا] نعم []
8.	في البندر رقم 7، إذا لم يرتفع الصدر، يفحص مزود الخدمة مدى إحكام الكمامة على وجه الطفل، ووضع الرأس، ويزيد الضغط أو يعدل الكمامة.	لا ينطبق [لا] نعم []
9.	تنطبق البنود التالية في حالة عدم ارتفاع الصدر: يقوم مزود الخدمة بفحص معدل ضربات القلب لمدة 6 ثواني ويتصرف بناءً على ذلك كما يلي:	
9.1	إذا كان معدل ضربات القلب أقل من 60 يستمر بإجراء التنفس، ويبدأ بالضغط على الصدر، ويستعد لتركيب الأنابيب (intubation).	لا ينطبق [لا] نعم []
9.2	إذا كان معدل ضربات القلب أقل من 60-100 يستمر بإجراء التنفس، ويستعد لتركيب الأنابيب (intubation).	لا ينطبق [لا] نعم []
9.3	إذا كان، معدل ضربات القلب أكثر من 100 يفحص وجود تنفس تلقائي ثم يوقف التنفس بالضغط (positive pressure breathing) ببطء ويتم تنبيه الطفل حسيًا.	لا ينطبق [لا] نعم []
9.4	في البند السابق إذا لم ينتفخ الطفل تلقائياً يستمر مزود الخدمة بإعطاء التنفس بالضغط ويستعد لتركيب الأنابيب (intubation) من أجل تنفس صناعي طويل.	لا ينطبق [لا] نعم []
10.	خلال عمل الخطوات السابقة يقوم مزود الخدمة بالتالي:	لا ينطبق [لا] نعم []
10.1	حساب دقائق قلب الطفل بدقة لمدة 6 ثواني.	لا ينطبق [لا] نعم []
10.2	التصرف بطريقة فعالة مهنية – بدون أي تأخير.	لا ينطبق [لا] نعم []
10.3	التعامل مع الطفل بسلامة دون التسبب بأذى للطفل.	لا ينطبق [لا] نعم []
10.4	يقوم بعملية التنفس للطفل بضغط مناسب.	لا ينطبق [لا] نعم []
10.5	إذا استمر إجراء للطفل أكثر من عدة دقائق يتم إدخال أنبوب تنفس من الفم للبلعوم (Oropharyngeal tube).	لا ينطبق [لا] نعم []

*الرجاء توثيق الملاحظات الرئيسية على الممارسات العملية في التقرير الإشرافي مع الشرح بالتفصيل والتحليل إذا لزم الأمر، وتقديم الاقتراحات والحلول والخطوات المستقبلية كلما أمكن.